

ACERCA DE LA PRESENCIA DE *EUDROMIA FORMOSA* (AVES) EN BOLIVIA

ABOUT THE PRESENCE OF *EUDROMIA FORMOSA* (AVES) IN BOLIVIA

Lorena Conde Fernández¹, Julián Q. Vidoz¹ & Jesús Guerrero Ayuso²

¹Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Avenida Irala 565, Casilla postal 2489, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Autor para correspondencia: *E-mail*: lorenacondefernandez@gmail.com

²Universidad de Extremadura. Rectorado. Avda. de Elvas, s/n. 06071 Badajoz (España).

Palabras clave: *Eudromia formosa*, registros, Chaco, Tarija, Bolivia.

Key words: *Eudromia formosa*, records, Chaco, Tarija, Bolivia.

La perdiz *Eudromia formosa* habita en bosques de zonas áridas, sabanas y bosque seco de la región del Chaco, en Paraguay y Argentina (Cabot, 1992). La certeza que se tiene sobre la presencia de esta especie en Bolivia parecería hasta ahora dudoso y según Hennessey *et al.* (2003) no pasa de ser hipotética. En Sagot & Guerrero (1998), se propone incluir a *E. formosa* en la lista de aves del país, previa confirmación de dos observaciones en el Departamento de Tarija, la primera procedente del camino que une Boyuibe con Garay (Diego Maichos, Abril de 1996) y una segunda por François Dupret en la Reserva Natural Corvalán (Mayo de 1997). Por su parte, Tobias & Seddon (2007) sugieren que *E. formosa* se encuentra en la zona de Capirenda (Departamento de Tarija), en base a la información proporcionada por cazadores y por el tipo de hábitat presente. A ser conocido, desde un lugar cercano a esta misma localidad (15 Km al Noreste de Capirenda), un polluelo presumiblemente de *Eudromia elegans* habría sido colectado en 1957 (Banks, 1977), pero Remsen & Traylor (1983, 1989) consideran que debería confirmarse su identificación ya que *E. formosa* podría estar también en el país. A continuación se reportan recientes registros visuales y auditivos de *Eudromia formosa*, así como también información proporcionada por pobladores locales desde cinco sitios en la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija.

El 22 de Julio de 2004, J.G.A. observó un individuo (16:00) de *E. formosa* a ca. 9 Km al Oeste de Purísima (21°12'58"S, 62°39'56"O), y a otros cuatro a ca. 15 Km al Oeste de Crevaux (21°21'59"S, 62°39'49"O), a horas 16:30. Ambas visualizaciones fueron efectuadas al borde del camino, en bosque chaqueño de medianamente a bien drenado de la serie *Schinopsis quebracho-colorado* y *Acacia emilioana* con presencia de *Bulnesia foliosa*.

Posteriormente el 10 de Enero 2008, J.Q.V. observó dos individuos de esta especie en la Reserva Natural El Corvalán (21°39'S, 62°28'O, 290 m). Ambos individuos estaban juntos, en un área de matorrales xéricos con presencia de algunas cactáceas, donde el suelo era casi limpio y algo arenoso. Los ejemplares cruzaban un sendero que va en dirección Norte del área. La observación fue por algunos minutos ya que huyeron aparentemente por la presencia del observador. Las personas del lugar comentaron que nunca habían visto a esta especie antes, lo que podría indicar que es rara, Por otro lado, los comunarios indicaron también que otras especies de perdices como *Crypturellus tataupa* y *Nothoprocta*

cinerascens, son comunes en la zona. Es importante aclarar que el observador conocía previamente a *E. formosa* desde el Parque Nacional Copo (Provincia Santiago del Estero) en Argentina.

A su vez, entre el 6 y 11 de Enero de 2009, L.C.F. realizó una búsqueda de esta especie en el área de La Grampa (21°55'S, 63°37'O, 620 m.) y El Bagual (21°60'S, 63°40'O, 630 m). En ambas localidades se realizó playback utilizando una grabación de Paul Smith (www.xeno-canto.com, XC15601). Se permaneció los días 6 al 8 desde las horas 07:00-10:30 y 17:00-19:00 en La Grampa, donde no se registró la especie. Seguidamente en El Bagual se trabajó en los días 9 al 11 desde 07:00-10:30 y 17:00-19:00 horas, en una zona de pastizales altos (1-1.5 m). Durante la tarde (18:45) del 11 de Enero, después de realizar playback (2-3 min por intervalos de 10-15 min en casi una hora) se logró escuchar en dos oportunidades el canto de la especie, pero debido a las condiciones climáticas (viento y llovizna continua) no se consiguió grabar la vocalización. En estas dos localidades, también se realizaron entrevistas a 12 comunarios (5 hombres, 7 mujeres), de los cuales 10 estaban seguros de haber visto y cazado a esta especie en sitios cercanos a su comunidad. El reconocimiento de *E. formosa* se hizo a través de láminas de guías de campo (Narosky & Yzurieta, 2006; Erize *et al.*, 2006), donde las personas lograban diferenciarlas de las demás perdices por su inconfundible cresta, misma que afirmaban era muy delicada y que se salía con facilidad al cazarla.

Si bien es cierto que no existe una prueba tangible como un espécimen, grabación o fotografía que corrobore los registros anteriormente mencionados, creemos que los datos presentados en el presente trabajo representan un indicio sobre la presencia de *Eudromia formosa* en Bolivia, por lo cual se propone incluirla en la lista de aves del país.

AGRADECIMIENTOS

A Oswaldo Maillard por su ayuda y comentarios en la preparación de la presente nota. A Claudia Venegas por su ayuda en la búsqueda bibliográfica. L.C.F. agradece a Carlos , Alexander y Jesús Conde por su ayuda en la fase de campo. J.Q.V. extiende un agradecimiento a Steffen Reichle y Vanessa Sandoval por su valiosa asistencia. J.G.A. agradece a Verónica Villaseñor y a Andrew Noss de WCS (Wildlife Conservation Society) quien financió, la expedición para la realización del mapa de vegetación del Chaco boliviano y al geobotánico Gonzalo Navarro por su amable invitación para que formara parte del equipo de trabajo como ornitólogo.

LITERATURA CITADA

- BANKS, R. C. 1977. A review of the crested tinamous (Aves: Tinamidae). *Proc. Biol. Soc. Wash.* 89:529–544.
- CABOT, J. 1992. Family Tinamidae (Tinamous). Pp. 112-138, *en*: Handbook of the Bird of the World. Volume 1, Ostrich to Ducks (J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal, eds.). Lynx Edicions, Barcelona.
- ERIZE, F., J. MATA, & M. RUMBOLL. 2006. Birds of South America Non-Passerines: Rheas to Woodpeckers. Princeton University Press.
- HENNESSEY, A. B., S. K. HERZOG, & F. SAGOT. 2003. Lista anotada de las aves de Bolivia. Quinta edición. Asociación Armonía/BirdLife International, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

- NAROSKY, T. & D. YZURIETA. 2006. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata-BirdLife International. Vazquez Mazzini Editores. Buenos Aires, Argentina.
- REMSEN, J. V. & M. A. TRAYLOR. 1983. Additions to the avifauna of Bolivia, Part 2. *Condor*, 85: 95–98.
- REMSEN, J. V. & M. A. TRAYLOR. 1989. An Annotated List of the Birds of Bolivia. Buteo Books, Vermillion, South Dakota.
- SAGOT, F. & J. GUERRERO (eds.). 1998. Aves y conservación en Bolivia N° 1 (Actas del IV Encuentro Boliviano de Conservación de Aves, 25-27 Oct. 97, Tarija). Asociación Armonía, Santa Cruz de la Sierra.
- TOBIAS, J. A. & N. SEDDON. 2007. Nine bird species new to Bolivia and notes on other significant records. *Bull. Br. Ornithol. Club* 127(1): 49–84.